الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Université de Tiaret

1ère année de médecine

TD1 EMBRYOLOGIE

Présenté par : Dr BOUDRA A

LA SPERMATOGENESE ET L'ETUDE DU SPERME

1-LA SPERMATOGENESE

- **SPERMATOGENÈSE** = formation des spermatozoïdes
- Elle se déroule dans les tubules séminifères des testicules
- Elle est déclenchée à la puberté par les hormones hypophysaires sous influence de l'Hypothalamus
- Elle s'effectue à partir des cellules souches (spermatogonies) et les spz se fabriquent en millions par jour
- Elle est permanente et non cyclique comme l'ovogenèse

1-LA SPERMATOGENESE

- Pendant *la vie embryonnaire*
- À partir des cellules souches (les spermatogonies)
- De *la puberté* (continue) jusqu'à la mort.
- Les étapes de la spermatogenèse (*la paroi du tube séminifère*):
 - La multiplication
 - L'accroissement
 - La maturation
 - La différenciation des gamètes mâles (spermiogenèse)
- Les spermatozoïdes sont libérés dans *la lumière du tube séminifère*.

Vésicule séminale viscosité du sperme+ Liquide séminal

secrète, avant chaque éjaculation, un liquide alcalin qui neutralise l'acidité de l'urètre avant le passage du sperme

Glande de Mary Cowper

impliqué dans la liquéfaction du sperme) d'enzyme protéolytique et de composés azotés : **spermine et spermidine** qui sont à l'origine de l'odeur

www.biologieenflash.net

Prostate

1-LA SPERMATOGENESE-a/ RAPPEL ANATOMIQUE

TESTICULE

TESTICULE

Le testicule (gonade mâle) est un organe ovoïde logé dans un sac cutané externe le scrotum, entouré par l'albuginée (ou tunique albuginée) **capsule conjonctive fibreuse inextensible** dont la portion épaisse forme le **corps d'Highmore** au pôle supérieur du testicule.

Médecine-Cours

1-LA SPERMATOGENESE-RAPPEL ANATOMIQUE

Du corps d'Highmore vers l'abuginée périphérique de fines cloisons conjonctives (septa testis) délimitent les lobules testiculaires (200 à 300 par testicules)

Coupe Histologique d'une section sagittale d'un testicule

a-section du testicule

b- section périphérique d'un lobule testiculaire

Chaque lobule contient 1 à 4 tubes séminifères au sein d'un tissu interstitiel riche en cellules de Leydig (cellules sécrétrices d'hormones stéroïdiennes : **Testostérone**)

Le tractus génital masculin est organisé en voies excrétrices intratesticulaires (1) et extratesticulaires (2) :

(1) Démarre au niveau des tubes séminifères qui déversent dans un tube droit qui déverse à son tour dans les réseaux de canalicules serrés (rete testis) :

(2) En continuité avec le rete testis, les cônes efférents sont liés au canal épидидymaire long et pelotonné sur lui même qui se poursuit en canal déférent, en canal éjaculateur puis en urètre pénien.

La coupe longitudinale montre que le testicule est formé de plusieurs lobules testiculaires contenant chacun de 2 à 4 tubes séminifères débouchant tous dans le canal de l'épидidyme.

1- structure du testicule: (activité 2)

a) Les tubes séminifères:

Chaque tube séminifère comprend:

- Une partie centrale appelée lumière du tube séminifère.
- Une partie périphérique appelée paroi du tube séminifère.

b/L'épithélium germinal:

-Cellules de Sertoli : cellules de grande taille et de forme complexe disposées tous les 40 à 30 μm comme des piliers d'organisation cellulaire

-Cellules de la lignée germinale, disposés entre les cellules de Sertoli de la périphérie vers le centre du tube séminifère, avec des stades successifs de la spermatogenèse

La paroi du tube séminifère comprend deux types de cellules:

- Des cellules de taille et de forme différentes appelées cellules souches des gamètes ou cellules germinales.
- des cellules géantes appelées cellules de Sertoli à rôle nourricier, sécréteur et de soutien.

1 - tube séminifère . 2 - lumières
 des tubes. 3 - cellules interstitielles
 (cellules de Leydig). 4 - vaisseau
 sanguin. 5 - enveloppe conjonctive
 d'un tube séminifère.
 6 - cellule de Sertoli.
 7 à 11 : les étapes successives de
 la spermatogénèse.
 7 - spermatogonie. 8 - spermatocyte I.
 9 - spermatocyte II. 10 - spermatide.
 11 - spermatozoïde.

c/

Le déroulement de la spermatogenèse

La spermatogenèse se déroule dans les tubes séminifères, elle comprend 4 phases

- * **La Phase de multiplication** : les spermatogonies ($2n$ ch) se multiplient par mitose pour assurer la conservation des stocks de spermatogonies.
- * **La Phase d'accroissement** : certains spermatogonies augmentent de taille et deviennent des spermatocytes I ($2n$ ch dédoublés).
- * **La phase de maturation** : chaque spermatocyte I subit les deux divisions de la méiose :
 - La division réductionnelle qui donne deux spermatocytes II (à n ch dédoublés)
 - La division équationnelle : chaque spermatocyte II donne deux spermatides (à n ch simples)
- * **La phase de différenciation** : Les spermatides subissent de profonds remaniements et deviennent des spermatozoïdes : réduction du cytoplasme, formation de l'acrosome, apparition de la pièce intermédiaire et du flagelle...

04 : la spermatogenèse

N(d) ; chromosome dupliqué

n(s) : chromosome simple

La différenciation ou spermiogenèse:

d/ Différenciation :

C'est des cellules haploïdes à chromosome simple

***Formation de l'acrosome** par l'accumulation des appareils de golgi du spermatide

***Formation de la pièce intermédiaire** par condensation des mitochondries

***Formation du flagelle** par le centriole distal, alors que centriole proximale reste à côté du noyau du spermatozoïde

d-1. Structure du spermatozoïde

*la tête :

- effilée et rigide
- acrosome (pénétration dans l'œuf)
- le noyau (ADN)

*le col (cou)

*la pièce intermédiaire :

mitochondries en hélice (énergie), des microtubules et des fibres.

*le flagelle :

des microtubules et des fibres (déplacement, mobilité et motilité)

ON PEUT NOTER 4 ÉTAPES PRINCIPALES RÉALISÉES SIMULTANÉMENT :

1-Réorganisation nucléaire : condensation, on passe à un noyau ovale, élimination des nucléoles, remplacement des histones par des protamines au niveau de l'ADN. C'est une compaction protectrice ; **(ADNase)**

2-Formation de l'acrosome : migration de l'appareil de Golgi, fusion des vésicules golgiennes en une vésicule acrosomiale formant l'acrosome (2/3 du noyau, enzymes) ;

3-Élongation du flagelle : le centrosome migre à l'opposé ; le centriole proximal forme le complexe centriolaire et le centriole distal s'allonge grâce aux microtubules et forme l'axonème ; les mitochondries viennent former un manchon en hélice autour ;

4-Élimination du cytoplasme en excès (corps résiduel) qui sera phagocyté par la cellule de Sertoli et obtention de la forme allongée du spermatozoïde.

Durée de la spermatogenèse = 74 jours

e/Contrôle hormonal

2-L'ETUDE DU SPERME

2-L'ETUDE DU SPERME

Le **spermogramme et le spermocytogramme** constituent les examens clés de l'exploration de **la fertilité masculine**. Ils font partie du bilan d'infertilité du couple.

La majeure partie du sperme provient **des sécrétions des glandes accessoires** du tractus génital, auxquelles s'ajoutent les spermatozoïdes produits par les testicules (**5 à 10 %**) seulement du **volume de l'éjaculat**)

a/ Spermogramme

a/ Spermogramme - a-1. Aspect macroscopique

1/ La couleur blanchâtre légèrement jaunâtre

2/ Le volume de l'éjaculat : il est compris **entre 2 à 6 ml** , varie d'un homme à un autre et il augmente en cas **d'abstinence** prolongée (en ml)

3/ Le pH du sperme : variable entre **7,2 et 7,8**

4/ La viscosité du sperme : 30min à 1 h après l'éjaculation, liquéfaction grâce à des enzymes d'origine prostatique. **Cause majeure des infertilités !!!**

a/ Spermogramme - a-2. Aspect microscopique

1/ La numération des spermatozoïdes

La numération des spermatozoïdes (par Nbr/ml) : à partir du sperme liquéfié à l'aide d'un hématimètre (cellule de Thoma).

(Hématimètre est une lame de verre spécifique permettant le comptage cellulaire au microscope).

- 15 millions < N < 250 millions de spermatozoïdes par cm³ de sperme
- N > 39 millions de spermatozoïdes dans l'éjaculat

Cellule de MALASSEZ

Cellule de NEUBAUER

Cellule de THOMA

Cellule de BURKER

Cellule de NAGEOTTE

PRINCIPE. On dépose, entre cellule et lamelle, une goutte de l'échantillon, dilué ou non, puis on compte dans le quadrillage (volume précis) les éléments voulus.

Cellule de Thoma

Le comptage cellulaire au microscope

2/ La mobilité

La **mobilité** des spermatozoïdes (en %) déterminée suite à l'observation à l'état frais de la mobilité de 100 spermatozoïdes, 4 types de mobilité

Mobilité de type a : mobilité fléchante et rapide (vitesse $>25 \mu\text{m/s}$).

Mobilité de type b : mobilité lente (vitesse de $5-25 \mu\text{m/s}$).

a+b : mobilité progressive

Mobilité de type c : mobilité sur place ou mobilité non-progressive.

Mobilité de type d : immobilité.

M $a+b \geq 32 \%$ à 1h après l'éjaculation

3/ La vitalité

La **vitalité** des spermatozoïdes (%) déterminée suite à l'observation d'un frottis de sperme coloré à **l'éosine- nigrosine**, la vitalité de **100 spermatozoïdes** correspondant à la capacité des spermatozoïdes vivants à rejeter l'éosine contrairement aux spermatozoïdes morts qui se colorent en rose

$V \geq 58 \%$

4/ Dénombrement des GB

La numération des globules blancs dans l'éjaculat se fait à l'aide d'un hématimètre

Norme: Nbr GB/ml) < 1 million/ml de sperme

a/ Spermogramme - a-3. Anomalies

I-Anomalie de couleur

Pyospermie : présence de pus blanc dans le sperme flottant après liquéfaction du sperme (infection bactérienne)

Hémospemie : présence de sang (couleur rouge) hémorragie au niveau des voies excrétrices ou au niveau glandulaire

II- Anomalies de volume

Aspermie :
absence de
sperme

Hypospermie :
< 1.5ml

Hyperspermie :
> 6ml

III-Anomalie de numération des spermatozoïdes:

Azoospermie

Oligospermie

Polyspermie

absence des spermatozoïdes
mais présence de cellules
rondes

≤ 15 millions de spermatozoïdes
par cm³ de sperme

≥ 250 millions de
spermatozoïdes par cm³
de sperme

IV-Anomalie de Mobilité et de vitalité:

Asthénospermie : Si le pourcentage de mobilité à l'éjaculation $Ma+b < 32\%$.

Akinétospermie : Si les spermatozoïdes sont vivants mais immobiles

Nécrospermie : Si on trouve que des spermatozoïdes mort $v < 58\%$.

V-Anomalies de numération des Leucocytes

Leucospermie : > 1 million/ml

b/ Le spermocytogramme

Il correspond à **l'analyse cytologique et morphologique des spermatozoïdes au microscope optique**. Suite à la réalisation d'un frottis de sperme, une coloration de **Harris-Shorr** ou **coloration de Papanicolaou** rend mieux visible **l'acrosome, la région post-acrosomique, la pièce intermédiaire et le flagelle**

Le spermocytogramme permet d'évaluer :

➤ La morphologie des spermatozoïdes

➤ Le pourcentage des formes atypiques

- Normal : Si ≥ 4 % de spermatozoïdes normaux (OMS2010)
 - **Tératospermie** : Si ≤ 4 % de spermatozoïdes normaux

**NOUVELLES
RECOMMANDATIONS**
Si ≥ 15 %
Si ≤ 15 %

B-1. Les anomalies morphologiques

Dans le sperme des hommes féconds, **25 à 80% des spermatozoïdes présentent une morphologie anormale en référence à une forme normale.**

Il existe plus de **90 types de formes anormales** décrites par plusieurs classifications :

A/ par type d'anomalies du spermatozoïde

(formes immatures, formes vieillies, simples, dégénératives)

B/ Par type d'atteinte

ANOMALIES DE LA TETE

MACROCEPHALE MICROCEPHALE

DOUBLE

ACROSOME
ANORMAL

BASE
ANORMAL

EFFILEE

ANOMALIES DE LA PIECE INTERMEDIAIRE

ANGULATION

RESTE
CYTOPLASMIQUE

AMINCISSEMENT

ANOMALIES DE LA PIECE PRINCIPALE

DOUBLE

ABSENTE OU COURTE

ENROULEE

Paramètres	WHO 2010	Terminologie spermatique (pathologie)	Conseil du biologiste (laboratoire ZTP)
Volume de l'éjaculat	≥ à 1.5 mL	Hypospermie < 1.5 mL Aspermie = 0 mL	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle du prélèvement (recueil incomplet) • Rechercher une éjaculation rétrograde • Abstinence non respectée
pH	≥ 7.2	< 7.2 (pH acide)	<ul style="list-style-type: none"> • Défaut de fonctionnement des vésicules séminales (bilan échographique)
Numération totale des spermatozoïdes dans l'éjaculat	≥ à 39 millions dans la totalité de l'éjaculat	Oligozoospermie entre 10 et 38 millions Oligozoospermie sévère < 10 millions	<ul style="list-style-type: none"> • Consultation d'andrologie • Bilan hormonal (FSH-LH) • Bilan échographique • Bilan génétique
Absence de spermatozoïdes visibles dans l'éjaculat Très rares spermatozoïdes	0 < 100 000	Azoospermie (déterminer l'origine sécrétoire ou excrétoire) Cryptozoospermie ("spermatozoïdes cachés dans des cryptes")	<ul style="list-style-type: none"> • Consultation d'andrologie • Bilan hormonal (FSH-LH) • Bilan échographique • Bilan génétique • Biochimie séminale
Vitalité	≥ 58 %	Nécrozoospermie < 58 %	<ul style="list-style-type: none"> • Bilan infectieux (spermoculture-ECBU)
Mobilité totale (progressive ET non progressive)	≥ 40 % (ou mobilité progressive > 32 %)	Asthénozoospermie < 40 % de légère à extrême = akinétozoospermie (regarder si les spermatozoïdes sont vivants)	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle du prélèvement (savon) • Consultation andrologie • Bilan infectieux (spermoculture-ECBU) • Test de migration survie • Bilan immunologique (si agglutinat) = MAR-test
Leucocytes (polynucléaire neutrophiles)	< 1 million/mL	Leucospermie si ≥ 1 million/mL	<ul style="list-style-type: none"> • Bilan infectieux (spermoculture-ECBU)
Morphologie (formes typiques – OMS)	≥ 4 %	Tératozoospermie < 4 %	<ul style="list-style-type: none"> • Consultation d'andrologie • Bilan apoptose (fragmentation) • Typage des anomalies (recherche d'une anomalie monomorphe)

Tableau III : Prestations de conseil du laboratoire ZTP.

2023-2024

TD1

EMBRYOLOGIE

1ère année de médecine